

小兒熱性痙攣

什麼是熱性痙攣

發燒時有出現

四肢抖動、眼球上吊、口吐白沫
唇色發黑、意識喪失，時間約5分鐘內



好發時期

- ◎ 幼兒在成長過程中腦神經發育仍不穩定，體溫急速升高造成抽搐現象
- ◎ 常發生六個月至六歲的嬰幼兒
- ◎ 如家族有人發生，易有此現象

抽搐&發抖的區別

- ◎ 握緊抖動的手腳，如果仍抽動不停就是抽搐
- ◎ 發燒時不會意識昏迷，抽搐時會有意識昏迷



醫療處理

- ◎ 發燒時依醫師指示給予退燒藥物使用，避免高燒引發抽搐

發作時如何處理

- ◎ 側躺使口水流出，維持呼吸道暢通
- ◎ 清除身邊危險物品，保護寶寶不受傷
- ◎ 抽搐時牙齒會咬得很緊
不要強塞物品到嘴巴或打開嘴巴
- ◎ 觀察及記錄抽搐次數
- ◎ 尚未清醒前，先不要餵食
- ◎ 儘速送醫



參考資料

黃美智、蔣立琦總校閱(2018)·兒童神經系統疾病與護理·兒科護理學(六版)·台北市:永大·
製作單位:兒科加護病房 製作日期:2019.08

若您想對以上的內容進一步了解，請洽諮詢電話：05-2756000 轉 40 病房分機 4001、4002

stm 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您

2021年10月校閱