

黃疸自費照光治療說明書



The infographic is titled "新生兒黃疸" (Newborn Jaundice) in large, colorful characters. It features a central illustration of a smiling yellow baby sitting up, with a red liver icon to its left and a blue light box to its right. The text is organized into several boxes: a top box defining jaundice, two side boxes describing types of jaundice, and a bottom box detailing treatments. The background is light blue with white clouds.

新生兒黃疸

什麼是「新生兒黃疸」？
剛出生的嬰兒膽紅素代謝功能不成熟，出生後2-3天開始眼白及臉開始變黃，從頭逐漸擴展至四肢末梢，4-5天時達最高峰，7-10天膚色逐漸恢復正常。

母乳性黃疸

出生後4-14天內發生，常因母乳攝取不足，導致脫水或體重下降，而母乳中某些成份，會造成黃疸，可能持續兩個月。

病理性黃疸

出生後24小時內出現，且持續超過兩週。
常見原因：血型不合、蠶豆症、頭血腫、先天性肝膽疾病、感染情形。

如何治療？

1. 照光治療：以藍光照射皮膚，可增進膽紅素代謝，降低黃疸。
2. 換血治療：若黃疸上升至危險程度時，會考慮換血，將體內血液排出，再輸注新鮮血液。

膽紅素堆積

目前寶寶有輕微黃疸，但黃疸數值尚不符合健保照光治療給付規範。

本院可提供自費照光治療可降低寶寶黃疸數值。

若您願意讓寶寶自費照光治療，費用為465元/日，包含照光治療費、眼罩、照光治療後的黃疸值追蹤檢驗。

參考資料

衛生福利部國民健康署（2019，5月）· 認識膽道閉鎖· 取自

<http://www.hpa.gov.tw/Home/Index.aspx>

若您想對以上的內容進一步了解，請洽諮詢電話：05-2756000 轉

嬰兒室分機 4501、4502、新生兒中重度病房分機 4507、4508