

近視防治點用 Atropine 注意事項

Atropine 眼藥水雖可減緩學童近視之進行，但給予使用前，應先與病童家長溝通 Atropine 點眼帶來的不便及可能影響。例如：

1. 因睫狀肌麻痺所引起的調視機能障礙，可配戴雙焦或多焦眼鏡來減少日常生活或閱讀寫字的不便。
2. 由於瞳孔散大，會有較多的光線(含紫外線)進入眼睛，長期使用是否會對水晶體或網膜產生不良影響，目前仍屬未知，建議點用 Atropine 期間，戶外活動應戴防紫外線太陽眼鏡為宜。
3. 長期點用 Atropine，停藥之後，仍可能有調視能力降低現象。
4. 幼童視覺機能未確實發育完全前，最好避免太早使用 Atropine。
5. 點眼之 Atropine 劑量對年幼兒裡可能會太強，若須使用，須囑咐點後，輕壓內眥角數分鐘，以防全身性的吸收。
6. Atropine 眼藥水也可能引起過敏反應，須留心注意。
7. 極少數病人使用 Atropine 可能引起眼壓升高，亦須小心使用。


參考資料

中華民國眼科醫學會 http://www.oph.org.tw/?action=news_content&node=24&id=338

全民健康基金會-近視一產生無法回頭 如何防範惡「視」力加劇？(2018.4)

http://www.twhealth.org.tw/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=1321&category_id=52&Itemid=64

針對以上如有不適狀況時，請於上班時間至眼科門診就醫(上午 09:00-11:00、下午 13:30-16:00)，電話：05-2756000；非門診上班時間請直接就近至其它眼科門診就診。

 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您

2021 年 09 月校閱