

傷口引流管護理指導

一、目的：

傷口引流管一般是在手術後，放置於傷口內，目的為引流及觀察血水、膿液；避免傷口的壓迫及刺激周圍器官、預防感染、促進傷口癒合而所放置的。

二、注意事項：

1. 放置傷口引流管者，仍可下床走動，下床時可用別針或夾子固定於衣服上，並預留適當的長度，預防翻身或活動時拉扯到管子即可。
2. 引流管的位置一般均需保持低於傷口引流位置之下，以防止引流液逆流。
3. 引流液達袋子一半時，通知護理師予以倒掉。
4. 傷口引流處紗布滲濕時，請告訴醫護人員換藥。
5. 勿將引流袋拖垂於地板上，造成引流袋的污染。
6. 採半坐臥及多翻身，若無特殊醫囑禁忌，儘可能及早下床活動，可維持良好引流功能。
7. 勿壓迫及扭曲引流管，並觀察引流管是否通暢並固定妥善。
8. 若使用引流瓶者，瓶子要保持站立勿傾倒。
9. 若有以下情形，請告訴醫護人員：
 - (1)發燒，劇烈嘔吐，腹痛。
 - (2)引流管滑脫。
 - (3)引流出大量鮮紅色血液。
 - (4)引流量突然減少或無引流量。
 - (5)紗布滲液更換多次。
 - (6)傷口紅腫熱痛，並有膿樣分泌物等。
 - (7)引流袋，引流球快速充滿空氣時。
 - (8)若引流量逐漸減少，醫師會依傷口癒合情形，拔除引流管。

參考資料

台北榮民總院特殊護理章(傷口引流管護理)取自

http://www.vghtpe.gov.tw/iframe_pat03b.html

翁淑娟、黃嫦芳、程紋貞、林麗味、趙淑美、張怡娟、陳昭吟、楊文琪、胡綾真、蔡家梅、羅靜婷(2018)·傷口引流管之護理·於李皎正總校，*內外科護理技術*(第八版，143-149頁)·台北：新文京

若您想對以上的內容進一步了解，請洽諮詢電話：05-2756000 轉 60 病房分機 6001、6002