






檢查日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 星期 _____

(檢查前一天)	服藥 (第一劑)	下午 5:00	 稀釋方式 300cc無渣冷飲 45cc司樂舒 將「司樂舒口服液」 +300c.c.較甜的無渣冷飲 泡製，30分鐘內喝完(如： 沙士、可樂、冬瓜茶、蜂 蜜水等，避免深色果汁)
	補水 2000c.c	晚上 6:00 ┆ 9:00	 1.晚上6:00~9:00分次喝完2000c.c水分 2.可喝白開水、蜂蜜水、運動飲料
	排便	晚上 6:00 ┆ 10:00	 服用後30-60分鐘開始 清腸作用時間約4小 時(依個人體質有所 不同)盡量蹲坐馬桶， 促進便意產生
(檢查當天)	服藥 (第二劑)	早上 4:00	 稀釋方式 300cc無渣冷飲 45cc司樂舒 將「司樂舒口服液」第二 劑+300c.c.白開水30分鐘 內喝完(建議用吸管喝，避 免口感太鹹而反胃)
	補水 500c.c	早上 4:30 ┆ 5:00	 1.早上4:30~5:00分次喝完500c.c白開水 2.5點之後全面禁水、禁食 3.執行無痛大腸鏡檢查前4小時禁食

司樂舒衛教影片



___月___日 星期___ ~ ___月___日 星期___ 下午5點之前，

請遵照下方飲食。

低渣飲食 檢查前二日



白飯



稀飯



白乾麵



麵線(無添加料)



蒸蛋(無添加料)



饅頭



去邊白吐司



細絞肉



肉鬆




去皮魚肉

不宜進食的飲食



蔬果



起司



牛奶



高纖豆漿

無渣流質飲食

___月___日 星期___ 下午5點之後僅喝下列飲料



清湯



運動飲料



白開水/蜂蜜水



茶



黑咖啡

※ 請務必遵守飲食建議，以達到良好的清腸效果，避免干擾檢查結果之判讀。

注意事項：

1. 若您正在服用其他藥物，服用清腸藥前請詢問醫師，以利評估用藥安全，並按照醫師指示服用，避免交互作用。
2. 服用第一劑及第二劑 司樂舒，前後至少相隔10~12小時使用
3. 急性腸胃潰瘍、不明原因腹痛者，請勿任意服藥。
4. 先天性巨大結腸、腸阻塞、閉鎖性肛門、充血性心臟衰竭、腎臟功能不全者請勿使用本藥品。

