

大腸鏡檢查前用藥提醒


Bokey 100mg **伯基**：血小板凝集抑制劑。健檢前三天停藥



Plavix 75mg **保栓通**：血小板凝集抑制劑。健檢前三天停藥



Gincare 9.6mg **銀杏**：改善末梢血管血循作用。健檢前三天停藥



Mafarine 2.5mg 、1mg **脈化寧**：抗凝血劑。健檢前三天停藥



大腸鏡檢查前用藥提醒

Dipyridamole 25mg 待匹力達：血管擴張，抑制血小板凝集。健檢前三天停藥



Pradaxa 110mg 普栓達膠囊：抗凝血劑。健檢前三天停藥



Xarelto 15mg 拜瑞妥膜衣錠：抗凝血劑。健檢前三天停藥



Lixiana 30mg 里先安膜衣錠：抗凝血劑。健檢前三天停藥



大腸鏡檢查前用藥提醒

Syntam FC 1200mg 欣坦膜衣錠：副作用抑制血小板的功能。健檢前三天停藥



Fylin 400mg 暢循持續性膜衣錠：改善末梢血管循環。健檢前三天停藥



Brilinta 90mg 百無凝膜衣錠：血小板凝集抑制劑。健檢前三天停藥



Eliquis 5mg 艾必克凝膜衣錠：抗凝血劑。健檢前三天停藥



降血糖藥物：健檢前一天晚上停藥，健檢當日將藥物帶來醫院。