

久裕企業股份有限公司 函

公司地址：新北市中和區中正路 880 號 14 樓之 5

聯絡電話：02-82277999 分機 2203

聯絡人：萬如耘

受文者：醫院/診所/藥局

發文日期：中華民國 112 年 01 月 05 日

發文字號：字第 11201002 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：新包裝照片/新版仿單

主旨：台灣邁蘭藥品 VIARTRIL-S POWDER FOR ORAL SOLUTION (維骨力加強型口服
MNTA4
溶液用粉劑，衛署藥輸字第 023724 號) 一包裝及仿單變更通知。

說明：

一、本公司為台灣邁蘭有限公司之經銷商。

二、台灣邁蘭藥品 VIARTRIL-S POWDER FOR ORAL SOLUTION (維骨力加強型口服
溶液用粉劑) 變更要點如下：

1. 自批號 2205636、2205637 起，藥商變更為台灣邁蘭有限公司。
2. 藥商地址及諮詢專線變更為台北市信義區信義路五段 7 號 27 樓 & 0800-616-868。
3. 外盒及鋁箔的顏色及內文排版變更，Logo 變更為 Mylan (詳見照片)。
4. 外盒條碼由 4717143401019 變更為 5099151927514。
5. 外盒不再加貼價格標籤。
6. 新仿單版本為 L1045F。

三、此次變更係依衛生福利部規定自行辦理更新，是項藥品之成分及售價均無改變，
敬請惠予繼續使用，不勝感激！

順頌 商祺

正本：醫院/診所/藥局

副本：

久裕企業股份有限公司

負責人：傅 輝 東



新包裝照片-1




舊包裝照片-1



新包裝照片-2



舊包裝照片-2



新包裝照片-3 (含防偽雷射標籤)



舊包裝照片-3 (含防偽雷射標籤&價格標)



新包裝照片-4



舊包裝照片-4



TW

Viartiril[®]S 維骨力[®]

1500 mg

加強型口服溶液用粉劑

Powder for oral solution

衛署藥輸字第023724號

醫師藥師藥劑生指示藥品

抗關節炎疾病、關節炎治療劑

【概述】

維骨力(Viartiril-S)的主要成分為結晶型硫酸鹽葡萄糖胺(Crystalline Glucosamine Sulphate),是由右旋硫酸鹽葡萄糖胺和氯化鈉化學合成的,為骨有機質、骨間質及關節內、外組織之重要成分。一般病理學上認為,若硫酸鹽葡萄糖胺的新陳代謝作用發生障礙或不平衡,可能造成骨關節病變。有研究實驗指出,患有慢性關節炎的病人每天適量補充硫酸鹽葡萄糖胺可幫助刺激及復原關節軟骨的新陳代謝。

【藥理作用】

結晶型硫酸鹽葡萄糖胺口服後經血液吸收,最後滲透進入關節腔中,約有15小時的長效作用。其藥理作用如下:

(A)骨關節之營養及促進新陳代謝作用:

--黏多醣為軟骨組織的主要成分,結晶型硫酸鹽葡萄糖胺能促進黏多醣合成,同時也能促進間骨組織合成。

(B)潤滑作用:

--結晶型硫酸鹽葡萄糖胺能改善滑囊液的黏性、增加滑囊液的產生。

維骨力對退化性骨關節特別有效,能:(a)減少骨關節疼痛(b)改善骨關節機能(c)抑制關節退化並具復原作用。

【成分】

每小包含:

有效成分及含量:結晶型硫酸鹽葡萄糖胺(Crystalline Glucosamine Sulphate)1884毫克

相當於Glucosamine Sulphate 1500毫克和Sodium Chloride 384毫克。

其他成分含量(賦形劑):Aspartame, sorbitol, macrogol 4000, citric acid。

【用途(適應症)】

緩解退化性關節炎之疼痛

【使用上注意事項】

請詳閱說明書後依指示使用。

一、有下列情形者,請勿使用:

- 1.對葡萄糖胺過敏的人。
- 2.有苯酮酸尿症(phenylketonuria)的人。

二、有下列情形者,請洽醫師診治:嚴重肝腎疾病的人。

三、有下列情形者,使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生:未滿18歲、孕婦、可能懷孕婦女、哺乳婦。

四、其他使用上注意事項：

1. 維骨力為病因治療，必須從開始治療後約一星期之後才有明顯的治療效果，因此當病情嚴重時，可從開始治療的第一天起，同時使用抗發炎藥品治療。
2. 請勿超過建議使用量。
3. 請勿使用過期產品。
4. 正確的儲藏環境及保持完整的產品包裝，才能確保保存期限內的藥品有效。
5. 為防止兒童誤食，請妥善保管。
6. 藥品應避免放置陽光直射或高溫，宜保存於室溫25°C以下乾燥的地方。

【用法、用量】

適用對象	使用劑量與頻次	治療期間
18歲以上，有關節炎症狀的人	每天服用一包(溶於一杯水，約100c.c.)，與餐併服較佳。	至少3個月。每隔兩個月可重複一次療程。

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
皮膚	過敏反應，如：紅、腫、癢或起疹子
腸胃	覺得胃不舒服、胃痛、脹氣、便秘、拉肚子、消化不良、噁心、嘔吐

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：過敏反應、伴隨搔癢和紅斑的皮膚性出疹。

【包裝】

4~30小包盒裝。

製造廠：ROTTAPHARM Ltd.

廠址：Darnastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Ireland

藥商：台灣邁蘭有限公司

地址：台北市信義區信義路五段7號27樓

電話：0800-616-868

L1045F

2866

 Mylan