

藥物通知

115 年 04 月 08 日

藥字第 115-04 號

代碼	商品名	成分名	衛生署核准適應症	健保價	說明
SOT1	Sotyktu 6mg/tab	Deucravacitinib	BC28554100 適用於治療適合全身性療法或光照療法的中度至重度成人斑塊型乾癬。	396	健保事前審查
DAS5	Dasatinib 50mg/tab	Dasatinib	AC61976100 治療新診斷的慢性期費城染色體陽性慢性骨髓性白血病 (Ph+ CML) 的成人。治療患有慢性、加速或急性期慢性骨髓性白血病，且對先前含 imatinib 的治療有抗藥性或無耐受性的成人。亦適用於患有費城染色體陽性急性淋巴性白血病 (Ph+ ALL)，且對先前含 imatinib 的治療有抗藥性或無耐受性的成人。 Dasatinib 適用於治療下列 1 歲以上兒童病人：患有慢性期費城染色體陽性慢性骨髓性白血病 (Ph+ CML)。併用化療適用於新診斷費城染色體陽性急性淋巴性白血病 (Ph+ ALL)。	1092	
KETC	KETO INJECTION 30mg/1ml/Amp	Ketorolac	AC42412209 短期(≤5 天)使用於緩解無法口服病人之中重度急性疼痛，通常使用於手術後。	16	DC KEROLAC 30mg/1ml/amp
STOA	Stothu 0.25mg/5ml/vial	Palonosetron	AC60319221 成人預防化學療法引起之噁心和嘔吐。中度致嘔性癌症化學療法-預防起始及反覆療程引起之急性及延遲性噁心和嘔吐。高度致嘔性癌症化學療法-預防起始及反覆療程引起之急性噁心和嘔吐。預防手術後引起的噁心和嘔吐(PONV)至少 24 小時，超過 24 小時的療效尚未得到證實。兒童與青少年(1 個月大至 17 歲)·預防高度致嘔性癌症化學療法引起之急性噁心和嘔吐。預防中度致嘔性癌症化學療法引起之噁心和嘔吐。	481	與 Okmilon 0.25mg/syringe 併存一年

說明：

1.新進中度至重度成人斑塊型乾癬用藥：Sotyktu 6mg/tab，本藥需先經健保事前審查通過才可健保給付使用。

2.Dasatinib 50mg/tab 為因應慢性骨髓性白血病（Ph+ CML）的成人之用藥治療，經藥委會 2025 年第 4 季同意臨採進用。

3.因應藥商停賣 kEROLAC 30mg/1ml /amp，經藥委會 2025 年第 4 季審查進用 KETO INJECTION 30mg/1ml/Amp。

4.預防化學療法引起之噁心和嘔吐進用 Stothu 0.25mg/5ml/vial，仿單記載預防手術後引起的噁心和嘔吐(PONV)至少 24 小時，超過 24 小時的療效尚未得到證實。本藥與 Okmilon 0.25mg/syringe 併存一年