

新一代抗憂鬱症的藥物

※選擇性血清素再吸收抑制劑(SSRI)

此類藥物選擇性抑制血清素 (serotonin) 的再吸收，但不會抑制正腎上腺素 (norepinephrine) 的再吸收。常見副作用：噁心、頭痛、顫抖、腸胃不適、失眠等，但有些病人反而會想睡覺。★代表性藥物：Lepax[®]，Prozac[®]，Seroxat[®]，Zoloft[®]

※雙重再吸收抑制劑(SNRI)

此類藥物作用機轉在於正腎上腺素 (norepinephrine) 及血清素 (serotonin) 的回收受到抑制，以此作為治療憂鬱症的症狀。常見副作用：噁心、嗜睡、暈眩、盜汗、食慾不振及性功能障礙等。★代表性藥物：Efexor[®]、Cymbalta[®]

※血清素第二型受體拮抗劑(SARI)

此類藥物除了阻斷Serotonin 5-HT₂接受器之外，也有稍微抑制突觸前神經元5HT再吸收作用。常見副作用：嗜睡、姿勢性低血壓、鎮靜作用、噁心、口乾、頭昏、衰弱及便秘等。曾報告會造成持續性陰莖勃起。★代表性藥物：Mesyrel[®]

※正腎上腺素及多巴胺再回收抑制劑(NDRI)

抑制dopamine，norepinephrine以及serotonin在突觸前神經元的再回收作用。常見副作用：焦慮、激躁及失眠等。★代表性藥物：Wellbutrin[®]

※正腎上腺素及特殊血清素抗鬱劑(NaSSA)

透過 α_2 -adrenergic receptors的阻斷，促使norepinephrine和serotonine的釋出，加強norepinephrine及serotonin的雙重效應；加上對突觸後5-HT₂和5-HT₃ receptors的阻斷，而具有抗憂鬱療效。常見副作用：食慾增加與體重增加、嗜睡(可能導致精神無法集中，通常發生於治療中的前幾個星期)、全身或局部水腫等。★代表性藥物：Mirtazapine[®]

參考資料


KingNet 國家網路藥典·

(https://www.kingnet.com.tw/knNew/medicine/medicine_index.html)

陳長安(2020)·常用藥物治療手冊(53)·台北市：匯華。

林式毅(2019)·精神藥物手冊(3版)·台北市：合記。

若您想對以上的內容進一步了解，請洽藥物諮詢專線：05-2756000 轉 1211

天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您

2020年09月校閱