

α 1-交感神經接受阻斷劑 用藥指導

一、本院用藥藥物名稱

□學名—Terazosin(商品名—Hytrin 2mg)定脈平(淡紅橙色，圓形)

□學名—Doxazosin(商品名—Xadosin SR 4mg)薩多心持續性藥效錠(白色，圓形)

二、藥物作用

降低周邊血管阻力來降血壓，亦可改善攝護腺肥大症狀。

三、正確服藥方法

1. 請配合醫師指示用藥，於每日相同時間服用此藥，即使狀況良好，仍應按指示服用。
2. 請整粒吞服”薩多心持續性藥效錠”，勿磨粉或剝半。

四、忘記吃藥時怎麼辦

想起時盡快補服，如已接近下次用藥時間，則不需補服，請勿一次服用兩倍或額外劑量。

五、藥物可能引起之副作用

1. 即便極為罕見，有些人服用藥物時可能會有極為嚴重或甚至致死的副作用。假如您發生下列副作用相關的任何徵兆或症狀，請立即通知醫生處理：過敏反應症狀如蕁麻疹、發癢等；嚴重眩暈或失去知覺；視力改變；性能力改變；心動過速；心跳異常；手臂或腿的水腫；勃起時間異常等。
2. 所有藥物皆可能引起副作用。但有許多人沒有或只有輕微的副作用。假如任何一項副作用令您困擾或是不會消退，請回診告知醫師。以下並未涵蓋所有可能發生的副作用，若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師：眩暈、便秘、腹瀉或稀便、嗜睡、感覺疲倦或虛弱、噁心或嘔吐、無法入睡。

六、服藥注意事項

1. 頭暈、嗜睡時避免開車及從事機械活動。
2. 請遵照醫師指示服藥，切勿擅自停藥或更改藥量，若連續多日未服藥需告知醫師。
3. 酒精會增加藥物血管擴張作用而產生暈眩故因避免喝酒。
4. 需定期量血壓及回診檢查，適度運動及飲食控制才能確保血壓控制得宜。
5. 為降低頭暈或昏厥的機率，坐姿或躺姿幾分鐘後應非常緩慢地站起。
6. 若您要進行白內障手術，請先告知醫護人員。
7. 薩多心持續性藥效錠的藥物是被包在不能吸收的外殼內，藥物可緩慢被釋出，空藥錠會由身體排出，因此若糞便中發現藥物外殼無須驚慌。


七、儲存方式

保存藥物於原包裝及緊閉容器中，儲存於室溫下，遠離潮濕及陽光照射，並放置於孩童拿不到之處。

參考資料

Hytrin 藥品說明書 Xadosin SR 藥品說明書

若您想對以上的內容進一步了解，請洽藥物諮詢專線：05-2756000 轉 3102

 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您
2020年07月修訂